

## FLÖHE- und wie man sie los wird


### Floharten:

Katzenfloh, Hundefloh, Geflügelfloh, Igelfloh, Menschenfloh

### Entwicklungszyklus am Beispiel des Katzenfloh: (häufigster Floh in Europa)

---

1. Der weibliche Floh beginnt nach einer Blutmahlzeit und dem Deckakt auf dem Wirt mit der Eiablage und legt bis zu **50 Eier** pro Tag.
2. Die Eier fallen zum größten Teil herunter und finden sich in großer Anzahl auf den Schlaf- und Ruheplätzen der Tiere: (z.B. Bett, Polstermöbel, Sofa, Decke, Teppich)
3. Aus den Eiern schlüpfen nach ca. 1-6 Tagen die Larven.
4. Larve 1 häutet sich noch zweimal bis zur Larve 3. Die Larven ernähren sich von Kot der erwachsenen Flöhe und von Hautschuppen von Mensch und Tier.
5. Die dritte Larve verpuppt sich und ist somit sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
6. Der Schlupf der erwachsenen Flöhe erfolgt unter normalen „Haushaltsbedingungen“ nach 3-5 Wochen. Bei ungünstigen Einflüssen können die Flöhe aber auch erst nach Monaten bis maximal einem Jahr schlüpfen. Der Stimulus zum Schlupf erfolgt durch Erschütterung des Bodens. So erklärt sich, dass in für längere Zeit leerstehenden Räumen, in denen die Larven überleben konnten, eine regelrechte „Flohinvasion“ auf das erste erreichbare Wirtstier, bzw. den erstbesten Menschen einsetzen kann.



## Behandlungsplan:

